## 数チャレ 第122回(2011年3月)

次の命題①、② が成り立つことを解答欄に証明せよ。

2n, 2n+1 (n は整数) と表される整数を , 順に偶数 , 奇数という。 集合 A を  $A = \{a^2 - b^2 \mid a, b \text{ は整数}\}$  と定める。

命題(1)「すべての奇数はAの要素である」

*m* を偶数とする。

命題 2「m が 4 の倍数であることは m が m の要素であるための 必要十分条件である」

出典: 2011 年 東京慈恵会医科大学

## 解答

① 任意の奇数は

2n+1 (n は整数)

と表されるから、

$$2n + 1 = (n+1)^2 - n^2 \in A$$

である。

(おわり)

② mが4の倍数であるならば,

$$m=4n$$
 ( $n$  は整数)

と表され、

$$m = 4n = (n+1)^2 - (n-1)^2 \in A$$

偶数mがAの要素であるとすれば,

$$m = a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

を満たす整数 a, b が存在し,  $m = a^2 - b^2$  が偶数であることより

$$a^2$$
と $b^2$ は偶奇が一致

する。隣り合う整数の一方は偶数であるから

$$a-b=a(1-a)-b(1-b)+a^2-b^2$$
 は偶数

であり、

$$a + b = (a - b) + 2b$$
 **も**偶数

である。したがって,

$$m=a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$
 は 4 の倍数

以上より, m が4 の倍数であることは, m がA の要素であるための必要十分条 件である。 (おわり)