## 図チャレ 第259回(2023年4月)

xy 平面上の曲線 C を , 媒介変数 t を用いて次のように定める。

$$x = t + 2\sin^2 t$$
,  $y = t + \sin t$   $(0 < t < \pi)$ 

以下の問いに答えよ。

- (1) 曲線 C に接する直線のうち y 軸と平行なものがいくつあるか求めよ。
- (2) 曲線 C のうち  $y \le x$  の領域にある部分と直線 y = x で囲まれた図形の面積を求めよ。

出典: 2023 年 九州大学

## 解答

(1) tで微分すると

$$\frac{dx}{dt} = 1 + 2 \cdot 2\sin t \cos t = 1 + 2\sin 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 1 + \cos t$$

接ベクトル $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$ が y 軸と平行となるのは

$$\frac{dx}{dt} = 1 + 2\sin 2t = 0$$
, すなわち  $\sin 2t = -\frac{1}{2}$ 

のときであり, $0 < 2t < 2\pi$  より

$$2t = \frac{7}{6}\pi, \ \frac{11}{6}\pi$$
  $\therefore \ t = \frac{7}{12}\pi, \ \frac{11}{12}\pi$ 

よって,Cの接線のうち,y軸と平行なものは

ある。

(2)  $0 < t < \pi$  における動点  $(t + \sin^2 t, t + \sin t)$  の動きをまとめると

| t               | (0)   |   | $\frac{7}{12}\pi$ |   | $\frac{11}{12}\pi$ |     | $(\pi)$      |
|-----------------|-------|---|-------------------|---|--------------------|-----|--------------|
| $\frac{dx}{dt}$ | (1)   | + | 0                 | _ | 0                  | +   |              |
| $\frac{dy}{dt}$ | (2)   | + |                   | + |                    | +   | (0)          |
| C               | (0,0) | M |                   | V |                    | 1/2 | $(\pi, \pi)$ |

 $0 < t < \pi$  において

$$x = y \iff 2\sin^2 t = \sin t \iff \sin t = \frac{1}{2} \iff t = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$$

曲線Cはyの関数x=f(y)のグラフとみなすことができて,直線y=xとは2点

$$\left(\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}, \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}\right), \left(\frac{5}{6}\pi + \frac{1}{2}, \frac{5}{6}\pi + \frac{1}{2}\right)$$

で交わり, $0 < y < \pi$ において囲まれた部分は

$$\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \le y \le \frac{5}{6}\pi + \frac{1}{2}, \quad y \le x \le f(y)$$

となるから,求める面積Sは

$$S = \int_{\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}}^{\frac{5}{6}\pi + \frac{1}{2}} \{f(y) - y\} \, dy$$

ここで ,

$$\begin{split} \int_{\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}}^{\frac{5}{6}\pi+\frac{1}{2}}f(y)dy &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi}x\frac{dy}{dt}dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi}(t+1-\cos 2t)(1+\cos t)dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi}\left(t+1-\cos 2t+\cos t-\frac{\cos 3t+\cos t}{2}+t\cos t\right)dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^2+t-\frac{1}{2}\sin 2t-\frac{1}{6}\sin 3t+\frac{1}{2}\sin t+t\sin t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi} \\ &\quad -\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi}1\cdot\sin t\,dt \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{25-1}{6^2}\pi^2+\left(\frac{5}{6}\pi-\frac{\pi}{6}\right)-\frac{1}{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &\quad -\frac{1}{6}(1-1)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{5}{12}\pi-\frac{\pi}{12}\right) \\ &\quad -\left[-\cos t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi} \\ &= \frac{\pi^2}{3}+\pi+\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos\frac{5}{6}\pi-\cos\frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\pi^2}{2}+\pi-\frac{\sqrt{3}}{2} \end{split}$$

であるから,

$$S = \frac{\pi^2}{3} + \pi - \frac{\sqrt{3}}{2} - \int_{\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}}^{\frac{5}{6}\pi + \frac{1}{2}} y \, dy$$

$$= \frac{\pi^2}{3} + \pi - \frac{\sqrt{3}}{2} - \left[\frac{1}{2}y^2\right]_{\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}}^{\frac{5}{6}\pi + \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\pi^2}{3} + \pi - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{5}{6}\pi + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}\right)^2 \right\}$$

$$= \frac{2}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\stackrel{\clubsuit}{\cong})$$